

**DE CONTRA-  
IRRITATIONIBUS  
DISSERTATIO  
INAUGURALIS QUAM  
... AD MEDICINAE...**

---

Camillo Muzzi

DE  
CONTRA-IRRITATIONIBUS

*Quartile* *Mangrovia*

QUAM

ADVENTITIAM

PHILIPPUS JOSEPHUS NAGLER DOCTOR

OPHTHALMICUS MUNICIPII REGII

ET CLINICUS S. S. HOSPITALIS

AUSPIC

D.<sup>m</sup> ALOYSIO SCARENZIO

PHYSIOLOGIAM ET PATHOLOGIAM S. S.

AD *Medicinam* *Internam*

RITE ASSEQUENDAM

IN C. S. UNIVERSITATE TESSINENSIS

VEL COM TESSINIS UNIVERSITATE

*publica* *Neuchâtensis* *inferioris*

MUZZI CAMILLUS

EX PAPIA



TICINI REGII

Ex Typographia Sigesi

1863.



*Handwritten signature or mark.*

100

100

## DE CONTRA-IRRITATIONIBUS.

Contra-irritatio (sæ contra atque irritare) vox est quæ Medicinis utitur ad quamlibet irritationem designandam arte excitata scopo alterius irritationis vel phlogosæ in organis sedentis immittendæ, frangendæ, aut resurgendæ. Pars in qua contra-irritatio generatim applicatur corporis exteriori superficialis est : et quamvis nervillosam medicaminum internorum, ut essent purgantia, æmefica, etc. efficacia, contra-irritationi quam figunt probabiliter debeatur, hæc tamen sermo nostræ erit de contra-irritatione externa. Quam hæud raro occasio observandi occurrat plerumque morbus sponte ad sanitatem vergere per contra-irritationem forte evocata, probabile videtur medendi artem illam hac de causa in usum traxisse. Id frequentius observatur in membranarum mucosarum affectionibus sub-inflammatoriis, ut exempla non desunt in quibus mania, paralytis, ebrietas, aliarum plures ægrotudines tali modo sanatas sunt. Exanthemata, aliquæ morbi eruptivi idem quo-

4

dammodo antecedant, nam eruptio vel sit morbiliosa caratui effectus directus, nam nempe virium vitium, vel a causa peculiari affinitate cum viis sive causis morbilis per corpus vagante procedat, ejus adparibus intra quosdam limites salutaris erudit. Hoc prodatur ex levitate in intensis functionibus manifeste exorto, nec non a febris remissione indicata ab externa morbillorum, variolarum, scarlatinae, erysipelatis etc. eruptione. Interdum vero febris exacerbatur et symptomata causa hac de causis graviora fiunt. Ita pariter morbus chronicus totis aliquoties acritudinem membrorum mucosorum praesensentem mitigat; dum alia super ipsam reagit ac graviora reddit.

Hi parva vari etque etiam oppositi effectus atque producuntur a nova irritatione quae in systemate cutaneo arte excitatur: haec liquido patet quod si haec cautio haec cautio perpinietur, perturbationem potius credere potest quam salutem. Evidet experientia videtur aut aliud quodcumque contra-irritans, ab quibusdam organismis conditionibus, plagiis progressu, quae illud tollere destruitur. Si vero aliquoties quoniam aut utae conditiones, conditiones praecipuae in usque irritabilitate elementis generalis vel in excedenti nervorum systematis sensibilitate insistentem. Propter notam potest esse remedia, quae ad contra-irritationem adhibentur, alios habere effectus, a quibus maxime in prope causam salutis insistentem. Ex hi-

res nobis patet, quoniam utilitas a contra-irritatione expectanda est; nam effectus atque usus perpendimus sub diversis formis medicinis in quas praxis eam adhibet.

Contra-irritatio et relata ad suum gradum, et ad diversas partes partes super quas agi consideranda est. Itaque ordinatim recensere significabimus dicta rubefaciens, vesicantia, contra-irritantia pustulosa vel empyematosa, setones, cauteria, vesicantia perpetua, contra-irritantia evanescentia.

### *Rubefaciens.*

Contra-irritatio in suo gradu minimo consistit in erythemate capillarum cutis indurata, quod in completam resolutionem, interdum etiam in cuticula desquamacionem terminat. Quodcumque cuti adplicatum hanc contra-irritationis gradum promovere valet rubefaciens appellatur. Gradus moderatus caloris tam siccus quam humidus, olea essentialia, spiritus, æther, cinapia, pepper, alcohol lactis, acida mineralia diluta, vel acida debilia sub forma concentrata, et omnia fortiori contra-irritantia diluta adplicata, vel per breve tempus, super cutem vel rubefaciens agunt, atque ad hanc contra-irritationis gradum persequendum adhibentur. Nulla cum adit evanescentia præter insensibilem transpirationis augmentum, rubefaciendum acutè contra-irritationis principium il-

lenitat, et quidem melius quam illa officio-  
rum epispasticorum; causa porro in quibus  
assensum potestant neque levis neque rari  
sunt. Ampulla aqua admodum calida, aut aso-  
culca calidissima arena repleta, cataplasma ex  
melle panis vel farina seminum lini et aceto  
calida confectum cum quadam sinapi aut pi-  
peris quantitate, linimentum ammoniacale, vel  
oleum ammoniacale pro frictionibus adhibitum,  
paruali gonorrhoeae aut lumbi aethore aut spiritus  
camphorato muldi super cutem relictis, evapo-  
ratione impedita esse manus calida obtegendo,  
remedia sunt rubefaciens, quae assensum  
leves phlogosae internas removere, ac graves  
aliquantisper cohibere valent. Incipiens jugali  
inflammatio per linimentum ammoniacale an-  
teriori colli parti impostum saepe sanat;  
levis phlogosa catarrhalis aut rheumatica, eo-  
dem sanatur admixtulo, vel per oleum essentiali  
cappae, aliudve ad pectus, aut ad partem af-  
fectam adhibitum; affectus gastrici, speculim  
quando a forti medicamento duci possit, a  
simplici haud raro leniter, vel etiam ab aqua  
calida ampulla epigastrica adhibita; atque pro-  
prietas quoque rubefaciens juxta derastrum,  
pediluvia, quando adhibita fuerint sinapi, vel pi-  
peris, aut acida fortioribus adhibetur ad co-  
ncreta lavanda in febribus cum vigilia, se-  
pore, aut sub-delirio. Phlogosae chronicae mi-  
tiores nonnullae utpote remedia peracuta,  
rubefaciens habent. Tali pacto emplastrum ex

gallano ac pice, cujus recto irritans contrari-  
dam pulvere additum quoque intenditur,  
contra tussim atque chronicos rheumatismos  
haud parve utilis est. Compositio recte  
emplastri ex rapae et unguenti murcato, uti-  
liu adeo famulatur quibus quae lentes hrent,  
aliud suppeditat exemplum: verum et aliud  
famulare reperiet possumus in effectu parati  
hujus recentis cui inpositi, qui nullo alioque  
debito proprietati rubefaciendi, tribui debet. Il-  
lac factis addi possunt frictions atque elec-  
trices facillae, quae essentialiter sunt rubefa-  
cientes, acrimoniae quorundam arptionem popu-  
larum signant; nec non lenissae magneticae,  
quae nonnulli Galliae medici commendant, de-  
cente Latente, simili effectu gaudent. Rubefa-  
centis speciem si magna in extensione admo-  
vantur, stimulantia generalis ac localis sunt:  
et quovis eorum localis effectus generalis  
elidit in levi febrili incitamento corbus, mi-  
nus admittenda sunt ubi diathesis generalis  
phlogistica praesent, in gravioribus atque  
extensis inflammationibus fortioribus contri-  
rificantibus locum cedere debent.

Contrairitantia rubefaciencia magis activa  
sunt sinapium, cataplasmata nempe ex sinape,  
eorumque actio adeo prompta et efficax est,  
utpote ceteris irritantibus celsioris aint, quo-  
viscumque irritum substantiam locale opus  
est. Communiter sinape parique alia compo-  
nunt in aequalibus aut diversis proportionibus,



et ad anaplasmatia consistentiam per acetum acidum redduntur. Preschermius Tromms et Blane (anno 1830) nonnulla experimenta descripsit de anaplasmatum compositione. Illi detulerunt acetum plurimum immiscere proprietatem irritantem anaplas facere, quam acetum uas cum semine fieri continet, et hinc commendauerunt ut cum aqua efflueretur anaplasium. Aut anaplas anglicae pulvis, quem est ferreus flos ex integro a acetosa parte cordiali separata, neque efficitur ut quando aceto vel aqua commiscetur. Sinapium et sinape recantur molita confusi, promptius agunt quam illi ex sinape longum per tempus servata. Tromms et Blane sinapium cum alcoholis experti sunt, verum minus effluens esse quam illi ex aceto et aqua decurrunt. Doctor Paris ad anaplasmatum effectus sollicitandos terribitantes clausi commendat, cupis effluens pendet a proprietate extrahendi oleum essentiali quod seminem sinapis principium irritans constitit. Sinapium parvis horis momentis post eorum applicationem caloris sensum excitant, qui usque ad dolorem acetum urentemque interit, et ad eum crebital intensitate gradum ut perire intolerabili erudit. Post aliquod tempus dolor immittitur et penderis ac plenitudine subsequitur. semine omni videtur arteriarum pulvis. Inter viginti aut triginta horis momenta dolor sensus iterum redit, et si asperitas insensibilis non est propter aliquam cuticlem affectionem.

stuporisi adplicationem ultra hanc diutius  
ferre nequit. Effectus qui in eade contingunt  
notatis digni sunt. Stuporosis ante adplicationem  
pauca tantum universa roborem eadem in pro-  
portione ac dolorem minus riget, ac paulo  
post quae ablatas fuerit, colorem eadem a  
adplicatione patet. Quando per decem et plura  
horae momenta relinquatur, color sit ruber  
coloris, qui longius prodeat tempus post sen-  
sationis cessationem interdum vixis effusa-  
tur irregularis post quadraginta aut quinqu-  
aginta minuta, sed valde imperfecta neque in  
proportionem cum phlogosico gradu. Talis est  
inflammationis intensitas, ut gangraenae immi-  
nent periculum, si stuporosis adplicationes ultra  
horae remaneant. Donec sensibilitas riget, do-  
lor immediusa securitas erit contra nimis  
diuturnam stuporisi adplicationem; sed in  
stuporis ac insensibilitatis casibus permitti non  
debet ut ultra horae adplicationes remaneant. Do-  
lor a stuporosis excitatus ope adplicationem  
frigiderum, vel, juxta doctores Trevisani et  
Blanc, escapularium ex foliis hyoscyami, bel-  
ladonnae et stramonii, vel methuonum hanc  
plantarum extracta confectum leniri potest.  
In pluribus organorum phlogosis, in particu-  
laribus nervosis, spasmodicis, neque phlo-  
gosis propter suam ardem, plus quam propter  
gravitatem atque extensionem periculosam,  
stuporisi maxime virtute quaeque consistunt.

### *Psittacina*

Secundus contra-irritationis gradus, de quo sermonem habebimus, ille est in quo capillaria incitata fluidum manant serena, quod epidermidem seipsum e cuti, cutisque in variam. Magis activa et rubefacens, quam modo enumerabimus, si per temporis intervallum sufficienti adplicita maneat, hunc gi-gnant effectum; sed eorum vesicatoria pro-prietas haud semper rubefacienti respondet et generalem alia in usum trahuntur quae si-cuti vesicatoria cutis agunt. Quidem succi vegetabiles pariteram vesicarum eruptionem in-ducant: sicut illi mammillarum specierum ru-minali, clavatis etc. Ad cathartica reme-dium sistit, quod melius respondet uti vesica-torium, quodque via non semper adhibetur.

Proprietas activa hujus remedi, juxta Ro-binet diquisitiones, residere videtur in quo-dam principio peculiari solubi in aethere et oleo, cui cantharidinæ nomen datum fuit. For-ma itaque sub qua utilis adhibetur consistit in unione cantharidina in pulverem redacta-rum et exangue nullae vel alicujus substan-tiae pinguis, una cum ceris vel resinis data proportionis, quo mollis emplastei consisten-tiam obtineat. Hoc retinuum super sistam, certam vel aliam substantiam convenientem et cuti adhaerentem, caloris ac punctiois sen-

aut in parte cito gignit una cum circuli ac pulsuum incremento dum ampla sit adplicatio. Si post duas vel tres horas ex sicca amoretur, ejus effectus modo rubefaciens est, neque oritur varix; verum si relinquatur per sufficientem tempore spatium, varicum per varis indivisibile ex quoque ad decem horas, cutis in magna venarum elata reperitur sero flavescente repleta, quod et post alitum venarum sustineo continuat. Quibusdam in casibus venarum haud produnt donec medicatio peracta sit, quare minime necesse est et relinquatur ampliusculum, nisi adpletum usque dum efformatus sint, est, uti vulgo dicitur, extollantur venarum. Quando venarum bene elatas sunt, fortiter incidantur, et ita serum exit; si vero partem ad sanitatem constitare velimus, est cum simplici argenteo super linteum adhaere eam morderi. Sed accutis quandoque per aliquot tempus riget et nonne extollantur venarum: haec pariter ac alias tractandas sunt, medicamentum bis de die renovando. Fluxus veri per venarum inductus, ille vellet evocantia non minus quam contra-irritantia, et haec proprietas in medicamentis eorum fiscalisibus pedicandis maxime nocenti facienda est. Usque dum venarum perfectae evolutae haud sit venarum cunctis praesentem generalem effectum stimulantem, quos retinamus, uti pertinentes ad contra-irritantia generalem. Sed effectus veli loquensmodi effectus valdeperit natus, adeo ut

post institutionem pulvis debilitat ut plurimum inveniat quam satis valetutis adplicationem. Princeps valetutis incrementum haud raro ad facultates mentales diffunditur; ejus evectio depreSSIONem generalem affert cum proclivitate ad somnum. Hi diversi effectus in aliquibus individuis magis conspicui sunt quam in aliis, nec non pro morbi praesentis diversitate necessario differre debent.

At cunctarum proprietatibus quod est sui generis, quae influunt in actionem valetutis generalem saepe saepius exerceant.

Quando virus principium activum absorbetur et in organismum derivatur, admodum irritans evadit, et peculiar modo organa utroque aggreditur, stranguens, nec non locis saepe committi siccum inducit. Id ut praepediatur, segrestantibus saepe additur, ut perferente valetutis actione liquida diluentia mucilaginis abunde bibant. At aliter neque non periculis liquandi non parum ad valetutis utilisandas effectus conferre. Plurimum id phlogistonem, angustiam in illis certi diutius, valetutis scopis praecipuum est veri efficaciam exhibendi internam, vel ejus absorptionem promovendi, et id efficiant serum e sanguinis massa in vasa coagula extrahendo. Verum si in ventriculis magna copia liquida inducantur, cito absorbentur ac in fluida circumstantia evecta, effectum libent valetutis impete evacuationum locum, eoque simplicis

contra-irritantia reddunt. In hinc casibus per-  
utilis est abstinencia a magis lepidiorum co-  
pia, et hinc ad alia deveniendum est admi-  
cula, quo cantharidum absorptionis effectus  
irritantis praecaveatur. Hoc obtineri potest  
ponendo inter cutem et emplastrum vesicato-  
rium frustum veli aut talem subtilissimam oleo  
insutam, quod cum principium vesicatorium  
solvet, ipse effectus cuti transmittit, dum ve-  
lex aut tela impedit quominus cantharidum  
particulae cuti adhaerent, postquam epider-  
midis adjacentis superficie absorbentem cutem  
activam illam reddidit.

Generatim autem hae pro vesicantis appli-  
cationis regulae valident; citius vel tardius elata sit,  
vel non, si cutis hoc tempore rubra valde et  
inflamata praesens fuerit, vesicae quae consue-  
ter adparebit post emplastri remotionem. Ve-  
sicantis simplicita, ut Galli vocant *escaratoires*  
colunt, ut ab illis distinguantur quarum appa-  
rui die post applicationem sustinetur, sunt  
remedia jam merito commendata in infla-  
tionum cura. Utputa rubefactentia vel simpli-  
citer contra-irritantia, vesicantis simplicia  
aliisque medicaminibus antea enumerata ce-  
dent, quoad eorum effectum evanescentem loca-  
lem principem locum inter plura alia contra-  
irritantia tenent. Una cum aliis hujusce clasi-  
cis remediis, in primis acutis et subacutis  
phlogosae stadiis vesicantis maxime conveniunt,  
quam vero circuli inflammationum generali at-

reactionis vitæ intensitas per ressectiones vel alia admodum ideo fracta sint, ut ille ab-que periculo temperata ressectio scilicet fieri possit, tunc opus arto sit admodum salutaris, præcipuè partis affectas irritabilitatem tollendo, et dein eam ressectendo vel per seri effusionem destruendo. Hanc effusio admodum est, quo ad partem irritatam talis sit ressectio, ut aliarum partium morbosæ exhalationes resorbantur atque per ipsam eliminentur; et hinc ressectio plus quam rubefaciens in membranarum stratum phlogosibus indicatur.

Præter cautionem ressectio minime adhibenda in primis periodis, necesse est ut ressectio ne nimis prope phlogosum sedem exposita quippe coram præsentis gravitatem illam efficere possit, hanc phlogosum terminantes in usum importando. Inter circumsæ inflammationes, quæ membranarum stratis et processibus adiacentur maximum ex ressectio-ibus accipiunt beneficium. In phlogosibus plene ne partem effusione comitatis, horum effectus evacuantes uni pariter notæ sufficiunt. Sed in vicerum parenchymatis phlogosi, et in illa membranarum una cum magna effusione liquida, potentiora contra-irritantia majari efficacia polleat.

Summe requiritur prudentia ad statuem- dum tempus in quo ressectio cum evolutio- nem præsentis possent. Doctor Rush peti-

omnibus in febribus exiungere periodum, in qua salubria evadere possunt. Per contrahentes vel revulsivæ praeceptura potentioraque, uti sunt aqua chullina, emeticones plures observatas fuisse in pejus febrium formis, per ipsas enim aeger de repente a comate ad sui conscientiam revocatus fuit. Dominus Marjolinus suam causam uti exemplum hujusce causae in medium proferit. Sicut in subsequenti locali haecioni effectibus magnam adest ducimen, generatim enim ad gangrenam illa vergit, ita in omnibus tantum extremis ad hanc proxim confugiendum est.

Quidquid de rubefacientibus in affectionibus spasmodicis ac convulsivis dictum fuit, vesicantibus aequè referri potest, quae res ipsae acrium constitutioni quod generaliter adhibetur, quatenus vesica completa probabiliter inferior sit diaplanis per breve tempus iterum iterumque adplicata. Status erit irritabilitatis generalis organismi variis atque interdum febris debilibus constitutus, atque duritie ac pulsuum plenitudine, qui non raro vesicando adplicationis ope valdeperit lenitur, qui irritationem localem reddit atque ita organismum incolumem servatur.

Generatim vesicantium quae haec conveniunt in causam remanentem phlogosam, aliamque viam urinariam partem per effectus contrahendum irritantes super haec organa quando absorptio contingat, et quantum ad generatim



procedendi possit cautiones quas jam experientia observando, tamen quoddam aliud praefieri contra-indicata, res perquam prodens in hisce cautes est. Hoc saltem postulat ut ego pauca verba faciam de aliis remediis reobsteris.

Quamvis agentia irritantia quae maxima celeritate atque efficacia agunt, quia epidermidem destruant, non extollunt primitas in vesicula fluido seroso repleta. Ita aqua chalybeata, ejus vapor, alcohol concentratus, atque metalla calcinata in aqua, uti a Domino Antonio Carlsio commendatur, haec parum efficiunt.

Calor intensus, acida fortia, nec non quoddam sales metallici corrumpentes ac destruentes cuticulam immediate uti escharotica potius agunt: sed hic vesiculae provocandi modus periculosus creditur; per se phlogosin quae illam constituit characteris est diffusae incertae, ac gravia saepe ulcera signis. Adest methodus vaporem aquae chalybeatae per locum adhaerendum, eoque vase strictam orificium praebentis, per quem vesicae evasari potest, quin profundiores partes petantur. Liquor ureae, cum cum aequale pondere acungiat sufficit ita applicari potest, ut intra quindecim aut viginti horae momenti vesicam ipsam, ut non minus necessarium est celeritas, haec agentia quovis ita temperata, tamen ut simpliciter vesicantis nequaquam scienda sunt.

*Contra-irritantia pustularia vel empyematica.*

Utiq; in presentiorum rebus fecimus de illis quibus inflammationes artificiales exteri-  
nas, quæ in resolutionem vel effusionem atro-  
cam tendere solent, adest vero classis po-  
tularum recte-irritantium, quæ profundiori  
modo adgreditur turgent cutaneam, partis in-  
ducendo secretionem. Acidum sulfuricam et  
nitricam quædam recte malarolæ immixtur  
dammodo misculam inueni cum oleo vel adipe,  
inducunt processum phlogisticum, qui cito  
formam accipit pustularem, pustulae par-  
te modo parvas et distinctas, modo mayo-  
res et confluentes relata semper ad quantita-  
tem et concentrationem addi adhiberi. Sed  
preparata quod magis respondet ad pro-  
mouendam inflammationem pustularem, est  
tartarus stibi. Doctor Jenner fuit primus  
qui hoc medicamentum externe adhibuit sub for-  
ma vaganti, proportionem partis unius baji-  
ce præparati cum quinque vaganti sperma-  
tuli. Progressu temporis ab omnibus medicis  
adhibitus fuit, et fere nunquam uti irritans pu-  
stulare præscribitur, et in modo quo contra-  
ritus ad gignendum veniens.

Tartarus stibi non exercet in cuticulam  
actionem corrosivam aut solvèntem, unde sit  
et interdum magis cum diligentia effectus  
hujusmodi adplicationis perueniri possit, et eo

15

magis difficultas adveniat quo magis sciende  
sit impotenti uti curia. Ad hoc vitandum  
oportet ut eorum pars existeret cum lotio,  
vel periculo, est spiritus camphorato, est es-  
sentialissima utique per partes horum momenta  
adplicita. Excitata vasculoritate et sensibilita-  
te cutis, delibetur argentiura et tartaro sti-  
biato, et effectus erit aequalibus et certior :  
dem e contra cum methodo ordinaria habu-  
mus paucos testum et amplas pustulas.

Alia methodus contra-irritationis inducta  
per tartarum stibi, aut in solutione aquosa  
saturata ; per digestam et hujus formae de-  
coctionem non raro praefertur, quando praecipue  
videatur incommoda argenti adplicitio. Con-  
venit solutionem instillare eisdem ad illam  
aque gradum ut cutis illam ferre valeat, non  
aliter reddit aquam idoneam ad maiorem eorum  
quantitatem solvendam, et etiam in cute effe-  
ctus celeriter evadunt. Excitata priusque parte  
ubi jam diutius de argenti, delibetur solu-  
tio ope loti, et continuatur per plus minusve  
tempore spatium juxta effectus quibus indige-  
re. Pustulae tali modo excitatae frequenter  
sunt parvae et numeroae, et quando adplici-  
tio nec diu, nec iterate continuata fuit, celeriter  
evadunt et ementur. Post adplicitioem tar-  
tari stibi tam sub forma argenti quam solu-  
tionis convenit partes tegere. Inflammatio pu-  
stularum vel suppurativa tali modo excitata ge-  
neratur in ea solione contra-irritante cui ma-

gia permanens et profunda quam vesicae formatio. Pars formativa majorem postulat institutionem actionis vitalis, et gradum alterum localis irritationis quam effusa serosa, quin organizationem praestant actionem stimulante majori in gradu.

Iluc de re animadvertendum est tasterum stibi meliori sub institutione quam vesicante convenire ad amovendas inflammationes parachymatosas profunde reatas, aliam in studio acuto; et quaevis praetermittendae non sint pro necessitate sanguinis depletionis, nihilominus recte minori facilitatione quam ad vesicantia possumus ad hoc praeparatum confugere, quin absorptis pharmaci et ejus irritatio in organizationem modo scriptiologica agit, potius quam irritatio. Absorptionem namque contingere debet potest a nascente et vomito interdum pertinet qui ab usu hujus medicamentis exoriantur. Foram stibi contra-irritantibus locum cedit in pleuritide, meningitide, et illis inflammationibus in quibus metus praecipue adest effusio serosa. Pariter contra gastritidem non aridet per vomitum quem provocat. Prae vesicantibus adligendam viam erit in pleuritis alia inflammationibus acutis, atque peculiari modo ejus praesentia abunde comprobata sunt in phlogosi pulmonum, bronchiorumque. In chronicis inflammationibus virtus contra-irritans tertio stibi unicuique patet. In bronchitide chronica et pertussi levamen offert:

magis quam vesiculis, et pluribus in quibus processum tuberculem definitum videtur. Nunculi ejus utilitatem experiri sunt in morbis articulationum et oculis; et adeunt chirurgi qui illo prae ceteris utuntur. Casus referuntur in quibus chorea, epilepsia, et alii morbi convulsi, nec non morbi, paralysis et nervosus, per castor-urinationem a tartaro emetico ad sanam, secus spinam, aut secus nervi ducentem inductam, brevem obtulerunt, immo etiam sanabantur; bene quoque respondet ad derivandas inflammationes oculos, auris, et faciem, quae quandoque a penduli pendenti aegrotantis constitutione et morbi perdifficili negotio sanantur. Quando inflammatio a tartaro emetico excitata nimis intensitas, passim illam mitigare ope applicationis cataplasmatis panis calidi, quod non oppositae progressui postularum.

*Painentia papulosa, Castoria et Solonca.*

Inflammatio hinc orta admodum varie praebet gradus intensitatis, et secretis nunc est purulenta, nunc serosa. Irritatio per castor et setonem magis profunde instituitur, et tunc ipso tentis subestans adhaerent.

Castoria consistentior oculis resolvendo per incisuram, per vesicatoriam, vel per saccharificae substantiae applicationem, uti essent, potius, citra argenti, mercurii sulfurei etc.; et

in vulnus introducendo aliquod corpus hetero-  
genum, causas irritationis sustinendas, et pro-  
vocandas ulcerationes. In producenda ulcere  
cavellorum opo., circumscribere oportet ope-  
rationem, et partes propinquas legitime certo  
adfectu loco ulcerationis perforata. Potiusne  
quam frustulum, quod foraminis loco apponitur,  
post quatuor vel quinque horas escharam effor-  
mat circumdatam areola inflammata. Eschara  
medicatis cum unguento cytrino, vel alio quo-  
cumque stimulo incipit attingi, per  
paucos dies aperitur, et deinde cadit escha-  
ra ulcere relicto plus minusve profundo.

Scissures conficiuntur integumentorum par-  
titionem perfodiendo, cum acuto fascicula  
lino, modo ut a duabus aperturis pediculus  
haereat fasciculum. Ut adaptatur irritatio, om-  
ni die his innunguntur cum unguento resino-  
so, et renovantur, ad serranda vulnera aperta.  
Renovandi necessitas potest videri a schistia-  
tione lingue vitæ gutti elastici, aut plumbi.  
Inflammatio exorta per scissuras interdum adeo  
intenditur, ut ad illam exhibendam opus sit  
conferre ad anaplasmatum usum, et eorum  
medicatio cautela postulat fore pertinentes  
chirurgico. Haec remedia, quando sufficienti  
energia agunt, maximam afferunt levamen in  
chronicis inflammationibus variis generis. Sic,  
interdum valent ad apoplexiam, paralyam, et  
alios morbos provocandos, quoniam in haec  
tentamento eductio non omnem potest

debeturæ opem. Adhiberi etiam possunt in morbis cutaneis ad revocandam naturalem contra-irritationem silentem. Omnibus in casibus in quibus actones vel cæteri instituti fieri, non sit prudens consilium de repente revocationem suppressere; sed id paulatim facere debemus, diligenter nimiam sustinendo physiologicam intestinorum actionem, aliorumque organorum secretum. Consilii hæc auxiliæ cum utilitate experti sunt contra tæmeram segmentum et effusum hydropicum.

### *Contra-irritans Cauteris.*

Omnes illæ operationes hoc nomine comprehendimus in quibus calor utpote contra-irritans applicatur ad eum cuius gradum exætas, et partis destructionem provocet. Hanc omnem operationem communis extat effectus exchere, aut ulcus profundum plus minusve intantum circumscriptum phlogosæ, a qua mortuus partis separtio determinatur, et inde ulcerosa ibidem foras producit. Localis tali modo incipiens inflammatio magnopere intensa est, et apparatus convulsæ medius fit. Aut a fortè caloris applicatione peculiaris et alius cuius videtur affectus, impressio minime fortis, vel systematis nervosi commotio, quæ non parum ad quosdam morbos sanandos confert.

Calor, ad cæterum institutendum per metallicæ instrumenta calefacta, vel substantias

comburentes, vel aquas chalcibentem atque vaporem, admoventur. Instrumenta metallica variis calefacta tempera, ad topicas intentiones irritationes et ulcere pignende admoventur. Haec operatio, quae Causticum attuale vocatur, prae aliis quocunque methodo, illam systematicam rationem de qua diximus commotionem provocat. Ad effrenos morbos convulsivos, epilepsiam, hysterismum, et locales spasmos moderandos valet. An a dolore, vel a quocunque alio systematicis nervis mutationem dependant hujusmodi effluvia, difficile distat; effectus interdum obtinetur priusquam, illis locis phlogoson promoveatur gradus, et per contra-irritationem vascularem agat.

Interdum ad caustica conficienda ferrum exhibetur igitur, partique per octo vel decem minuta secunda multa admoventur pressionem, et applicatio iterum etiam repetitur ubi ulcus optimum profundum. Cutis et tectus cellularis pro parte destruitur, et coctum, quae sex vel octo dierum lapsu cadit, efformatur, proximisque confectum ulcus idem ac causticum expostit tractamen. Basi se feliciter ex caustico actuali effectus habentur dum ad albam usque colorem calefactum metallum. Haec ratio ad plenum effluvia vitalitatem, partique sensibilitatem extinguit, et damando (ut Dr A. B. Thompson commendat) adiacens cutis cherta aqua madida olivae apta convenientique substantia defendatur, paliculis immixtiter dele-



ritica acustica, certisque remediis procurantur utilitates. Ceterum assidue ad antiquas vegetaciones, remanensque marbillosa destruenda assidue a chirurgia in usum trahitur.

Alia videtur ceteris adhibendi methodus, quae magis se procedens contra-irritantis naturam habet. In hanc finem, ferro ad rubrum usque temperiem ignito, cutem parallelis lineis, eo modo ut spatium inter eas phlogosis existat innuere, leviter tangimus. Tali modo longae, serrataeque efficiuntur escharae, quae intra octo vel decem dies ampliantur, dum cutis superficialis furti definetur inflammatione, et nonnisi magne suppurationis fivente, interdum per quindecim et ultra dies sese prodacente, molatus et phlogisticus ille combustionis status gradatim cesset. Ob gravem quae hic processus causet irritationem, ejus usus ad chronicas tantummodo corporalesque restringitur curas. Ad chronicam arthram intumescensum, adfectionemque rheumaticam posthuma euforanda bene adhibita fuit necesse.

FINIS.

## THESES DEFENDENDAE.

1.

Ventriculus princeps esophagearum fons.

2.

Opil presentia ad plures morbos dehel-  
landos ab ejus actione narcotica re-  
petenda.

3.

Febri symptomatum complexu.

4.

In gastro-enteritide purgantium usus dam-  
nandus.

5.

Haec semper dum symptomata cessant  
morbus perfecte sanatus est.

6.

Adstringentia topice adhibita summopere  
in primo etiam gonorrhoeae stadio pro-  
ficina.